



# ¿CUÁNDΟ SE REALIZÓ SU ÚLTIMA PRUEBA DE **PAPANI- COLAOU?**

**El cáncer de cuello uterino puede prevenirse** con las pruebas de detección regulares y la vacuna contra el VPH.<sup>1,2\*</sup>



**Hable hoy con  
su médico  
sobre pruebas  
conjuntas de  
Papanicolaou  
más VPH.**



Estudios muestran que el **95 % de los cánceres de cuello uterino se detectan** mediante pruebas de **Papanicolaou + VPH** (pruebas conjuntas).<sup>2,3</sup>



**Hágalo fácil:** Haga que sus pruebas de detección sean **fáciles de recordar**. **Prográmelas para** un evento difícil de olvidar o cerca de este, como por ejemplo **un cumpleaños o un feriado**.

\*Hasta el 93 % de los cánceres de cuello uterino podrían prevenirse con las pruebas de detección y la vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano).

Referencias: 1. CDC. Cervical cancer is preventable. <https://www.cdc.gov/vitalsigns/cervical-cancer/index.html>. Revisado el 5 de noviembre de 2014. Consultado el 1 de octubre de 2019. 2. Blatt AJ, et al. Comparison of cervical cancer screening results among 256,648 women in multiple clinical practices. *Cancer Cytopathol.* 2015;123(5):282-288. 3. Austin RM, Onisko A, Zhao C. Enhanced detection of cervical cancer and precancer through use of imaged liquid-based cytology in routine cytology and HPV testing. *Am J Obstet Gynecol.* 2018;150(5):385-392.

MISC-06239-301 Rev. 001 © 2019 Hologic, Inc. Todos los derechos reservados.