

Hacerte la prueba es sencillo

Para realizar una prueba de detección de la infección por *Trichomonas vaginalis* (TV), tu proveedor de atención médica obtendrá una muestra mediante un frotis vaginal sencillo e indoloro o una muestra de orina.

⊕ Si el resultado de la prueba es positivo: El tratamiento es sencillo. La infección se elimina con antibióticos en cuestión de días. Habla con tu proveedor de atención médica acerca del tratamiento que tu o tus parejas sexuales deberían recibir, ya que el 72 % de los hombres que son parejas sexuales de mujeres que tienen tricomoniasis también están infectados.⁵ Debes volver a hacerte la prueba 3 meses después del tratamiento para asegurarte de que no te hayas vuelto a infectar.² En caso de infecciones persistentes, debes considerar la prueba de resistencia.²

⊖ Si el resultado de la prueba es negativo: Habla con tu proveedor de atención médica sobre otras causas de síntomas vaginales. Tu proveedor de atención médica podría hacerte otras pruebas. En el futuro, debes acudir a tu examen ginecológico anual y hablar con tu proveedor de atención médica si tu conducta, hábitos o parejas sexuales cambian o si notas síntomas.



Hazte la prueba. Trata la infección.

Si tienes flujo vaginal u otros síntomas, habla hoy mismo con tu proveedor de atención médica sobre la tricomoniasis. Esta infección afecta a mujeres de todas las edades, sin ningún tipo de distinción.

Si sabes cuáles son los síntomas y controlas tu salud sexual, puedes reducir la probabilidad de contraer esta y otras enfermedades de transmisión sexual. Tu proveedor de atención médica puede aconsejarte sobre cómo protegerte y reducir tu riesgo.

Mientras más sepas sobre la infección por *Trichomonas vaginalis*, la prueba y el tratamiento, más confianza tendrás para tomar medidas y decisiones y sobre tu salud sexual.

Visita HologicWomensHealth.com para obtener más información.

Referencias:

1. CDC. Incidence, Prevalence, and Cost of Sexually Transmitted Infection in the United States. Última revisión: 16 de marzo de 2022. Consultado el 7 de julio de 2022. <https://www.cdc.gov/nchhstp/newsroom/fact-sheets/std/STI-Incidence-Prevalence-Cost-Factsheet.html>
2. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, Johnston CM, Muzny CA, Park I, Reno H, Zenilman JM, Bolan GA. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. MMWR Recom Rep. 2021;70(4):1-87. doi: 10.15585/mmwr.rr7004a1
3. Giocchino CC, et al. Prevalence of *Trichomonas vaginalis* and coinfection with *Chlamydia trachomatis* and *Neisseria gonorrhoeae* in the United States as determined by the Optima *Trichomonas vaginalis* nucleic acid amplification assay. *J Clin Microbiol*. 2012;50(8):2601-8. doi:10.1128/JCM.00748-12
4. Allsworth JE, Rutherford JA, Peipert JF. Trichomoniasis and other sexually transmitted infections: results from the 2001-2004 National Health and Nutrition Examination Surveys. *Sex Transm Dis*. 2009(12):738-44. doi: 10.1097/OLQ.0b013e3181b38a4b
5. Seña AC, Miller WC, Hobbs MM, Schwebke JR, Leone PA, Swygard H, Atashili J, Cohen MS. *Trichomonas vaginalis* infection in male sexual partners: implications for diagnosis, treatment, and prevention. *Clin Infect Dis*. 2007;44(1):13-22. doi: 10.1086/511144

PP-00175-301 Rev. 004 ©2022 Hologic, Inc. Reservados todos los derechos. Hologic, The Science of Sure y los logotipos asociados son marcas comerciales o marcas registradas de Hologic, Inc. y sus filiales en Estados Unidos u otros países. El contenido de este documento se ofrece solo con fines informativos y no está concebido como consejo médico. Comuníquese con su profesional médico para recibir consejos concretos acerca de su salud y tratamiento. Esta información puede que sea de relevancia en los EE. UU. y en otros mercados y no tiene como fin ofrecer ni promocionar productos donde dichas actividades estén prohibidas. Dada la distribución de los materiales de Hologic a través de sitios web, retransmisiones electrónicas y exhibiciones comerciales, no siempre es posible controlar dónde aparecen dichos materiales. Para obtener información específica sobre cuáles son los productos que están disponibles en un país particular, escriba a: diagnostic.solutions@hologic.com.



Prueba de detección de infección por *Trichomonas vaginalis*



**La última estimación del CDC revela
6.9 millones de nuevas infecciones
por Tricomoniasis¹**

Los síntomas vaginales de TV
incluyen²:

- ✓ Comezón
- ✓ Ardor
- ✓ Enrojecimiento o dolor en los genitales
- ✓ Malestar al orinar
- ✓ Flujo con olor inusual
- ✓ Sensación desagradable durante las relaciones sexuales

Si tienes uno o más de estos síntomas, es posible que tengas una infección causada por hongos, bacterias o un parásito llamado *Trichomonas vaginalis* (TV). El TV se transmite durante las relaciones sexuales y causa tricomoniasis.² La mayoría de las personas con TV, alrededor del 70 %, no tiene síntomas.² Sin tratamiento, la infección puede persistir durante años.²

Tricomoniasis: **La infección de transmisión sexual (ITS) curable más común²**

2.6 millones de
infecciones
en los
EE. UU.¹

¿Quiénes la tienen?

- ▶ Tanto las mujeres como los hombres se pueden infectar.²
- ▶ Puedes tener una infección por TV con síntomas mínimos o sin síntomas.²
- ▶ El porcentaje de infección es alto entre las mujeres de todas las edades.³
- ▶ Las tasas de prevalencia son tan altas en mujeres menores de 24 años como en mujeres mayores de 24 años.²

Los riesgos de las infecciones sin tratar:

Las infecciones por TV pueden durar meses o años si no son tratadas.² El diagnóstico preciso es esencial para determinar el tratamiento apropiado para la paciente y sus parejas sexuales.

Sin tratamiento, la infección por TV puede causar:

- ▶ Complicaciones en el embarazo, que incluyen parto prematuro y bajo peso al nacer en el bebé.²
- ▶ Mayor probabilidad de contagio de otras ITS, tales como el VIH, al tener exposición.⁴
- ▶ Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP).²
- ▶ Endometritis.²
- ▶ Molestias por los síntomas.

¿Cómo sabré?

La única manera de saber si tienes una infección por *Trichomonas vaginalis* (TV) es mediante un examen médico y una prueba de laboratorio que tu proveedor de atención médica ordenará.²

¿Debo hacerme la prueba?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) recomiendan que todas las mujeres que buscan atención médica por flujo o síntomas vaginales que tengan VIH se hagan la prueba de TV.²

El CDC también sugiere que los proveedores de atención médica consideren la prueba si²:

- ✓ Tienes parejas sexuales nuevas o varias
- ✓ Te diagnosticaron otra ITS
- ✓ No has usado condones invariablemente
- ✓ Te diagnosticaron VIH
- ✓ Tienes síntomas vaginales y estás embarazada
- ✓ Te diagnosticaron tricomoniasis y recibiste tratamiento hace 3 meses